

Carcinoma epidermoide cutáneo

Tabla de estratificación TNM (AJCC/UICC 8ª edición)

Nota: para **carcinoma cutáneo (no melanoma) de cabeza y cuello** (incluye CEC y CBC, excluye párpado). Adaptar siempre a la versión oficial vigente (AJCC/UICC).

1. Categorías T – Tumor primario (cT)

Categoría T	Criterios principales
Tx	Tumor primario no puede ser evaluado (p. ej. información insuficiente).
T0	No hay evidencia de tumor primario.
Tis	Carcinoma in situ.
T1	Tumor ≤ 2 cm en su mayor diámetro.
T2	Tumor > 2 cm y ≤ 4 cm en su mayor diámetro.
T3	Cualquiera de los siguientes: • Tumor > 4 cm en su mayor diámetro • Erosión ósea menor (p. ej., cortical) • Invasión profunda : más allá del tejido celular subcutáneo o profundidad > 6 mm (medida desde la capa granulosa de epidermis normal adyacente hasta la base del tumor) • Invasión perineural clínica o radiológica de nervios nombrados (sin llegar a agujeros de base de cráneo ni columna).
T4a	Tumor con invasión ósea macroscópica (corteza y/o médula ósea) de estructuras craneofaciales.
T4b	Tumor con invasión de base de cráneo o esqueleto axial , incluyendo compromiso foraminal y/o extensión hasta el espacio epidural.

2. Categorías N – Ganglios linfáticos regionales (cN)

Categoría N	Criterios principales (clínico/radiológico)
Nx	Ganglios regionales no evaluables.
N0	Sin metástasis ganglionares regionales.
N1	Metástasis en un solo ganglio ipsilateral , ≤ 3 cm en su mayor diámetro, sin extensión extranodal (ENE-) .
N2a	Metástasis en un solo ganglio ipsilateral , > 3 cm y ≤ 6 cm, ENE- .
N2b	Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales , ninguno > 6 cm, ENE- .
N2c	Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales , ninguno > 6 cm, ENE- .

Categoría N	Criterios principales (clínico/radiológico)
N3a	Metástasis en cualquier ganglio > 6 cm en su mayor diámetro, ENE- .
N3b	Metástasis en uno o más ganglios con ENE+ (extensión extranodal clínica/radiológica: compromiso cutáneo, fijación a estructuras profundas, invasión de partes blandas o signos de afectación nerviosa).
Recordatorio: AJCC 8ª distingue entre cN (clínico/radiológico) y pN (patológico). Los criterios de tamaño y ENE son análogos; pN exige recuento mínimo de ganglios evaluados según tipo de disección.	

3. Categorías M – Metástasis a distancia (M)

Categoría M	Criterios
M0	No hay metástasis a distancia.
M1	Metástasis a distancia (incluye ganglios fuera del territorio regional, p. ej. supraclaviculares contralaterales o a distancia).

4. Agrupación por estadios (Stage grouping) – AJCC/UICC 8ª edición

Estadio	Combinación TNM típica
0	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0 o****T1, T2 o T3 con N1 M0
IVA	T1, T2 o T3 con N2 o N3 M0 o****T4 (T4a o T4b) con cualquier N, M0
IVB	Cualquier T, cualquier N, M1

5. Uso práctico rápido

- Esta tabla resume la **clasificación clínica TNM** para carcinoma cutáneo (no melanoma) de **cabeza y cuello** según AJCC/UICC 8ª edición.
- El **CEC cutáneo** suele estadificarse con este sistema cuando afecta cuero cabelludo, cara, pabellón auricular, labio, región cervical, etc. (excluido párpado, que tiene capítulo propio).
- En la práctica dermatológica y oncológica, combinar siempre TNM con:
 - Grosor/invasión profunda exacta.
 - Grado histológico, patrón desmoplásico, invasión perineural/linfovascular.
 - Estado inmunológico del paciente y localización anatómica de alto riesgo.